

CARTILLA TÉCNICA N°2: BOTIQUÍN VETERINARIO

CONSIDERACIONES BÁSICAS

Para que los medicamentos no se deterioren y pierdan su efecto, es necesario guardarlos en un lugar **FRESCO, SECO y OSCURO**.

Mantener los fármacos y el equipamiento en una caja cerrada y en altura, los protege de ratones, insectos y humedad. Además, es importante mantener los fármacos e implementos ordenados, para poder encontrarlos con rapidez en caso de ser necesario. También considere que muchos de los fármacos son **fotosensibles** (se inactivan y pierden su efecto con la luz), en especial los que vienen en envase oscuros, por lo que hay que guardarlos en sus respectivas cajas y en un botiquín que lo proteja para garantizar su calidad y durabilidad.

En caso de vacunas u otros medicamentos que lo indiquen, conservarlos refrigerados (4°C), no congelados. **Si se congelan no sirven**. Debe tener en cuenta que no pueden perder la cadena de frío en ningún momento, por lo que si se transportan deben ir en una conservadora con hielo.

También es importante antes de utilizar cualquier medicamento **mirar la fecha de vencimiento, el periodo de carencia o resguardo y las restricciones de uso en algunas categorías de animales** (por ejemplo según la edad, gestación, o lactancia).

IMPLEMENTOS BÁSICOS





OPCIONES DE MEDICAMENTOS

ANTIBIÓTICOS

- Pullbiotic
- Mastilac
- Micospectone
- Gorban
- Diarrevet
- Oxitetraiclina L.A.

ANTIINFLAMATORIOS

- Febrectal
- Ket-10
- Hasyun (corticoide)

ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO

- Supolen Plus
- Bovimic
- Ivermectina
- Doractina

ANTIPARASITARIO EXTERNO

- Moskimic
- Invetroid

VITAMINAS Y MINERALES

- Vitamina E y Selenio
- ADE
- Vidatol
- Calfoma Plus
- Promotor L

VACUNAS ANTICLOSTRIDIALES

- Clostribac 8
- Coglavax

✓ Existe una gran variedad de medicamentos en el mercado, sin embargo, cada productor debe priorizar de acuerdo a sus necesidades los más necesarios.

✓ El uso de fármacos es **solo una parte del tratamiento**, no olvidar brindar:

- Alojamientos confortables y limpios
- Separar al animal enfermo del resto del rebaño
- Garantizar agua limpia y comida

PROPUESTA DE TRATAMIENTOS

PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS Ivermectina: 1ml/50 Kg - Vía Subcutánea	PARÁSITOS EXTERNOS Moskimic: 5ml/50 Kg -Aplicar sobre el lomo (a contra pelo)
Parásitos	
Doractina: - 1ml/50 Kg - Vía Subcutánea	FASCIOLA (Pirhuín, Yuta) Supolen plus : 1 ml/10 Kg --Vía Oral Bovifort : 1ml/50 Kg -.Vía Subcutánea

ANTIBIÓTICO Gorban: 3 ml/50 Kg -Vía Intramuscular / endovenosa Micospetone: 1 ml/10	ANTIINFLAMATORIO Febrectal: 2 ml/45 Kg -Vía endovenosa Ket-10: 1,5 ml/10 Kg -Vía Intramuscular
Diarrea	
REHIDRATACIÓN Agua limpia: Oral voluntaria o forzada. Rehsal-vet: Rehidratante -Vía oral (diluir en 1 Lt)	*Limpieza de corrales *En cabritos no destetados, nunca privarlos de leche.

ANTIBIÓTICO Mastilac: ½ pomo/ animal -2 veces al día hasta completar 3 aplicaciones Ceftidrag: 1 ml/50 Kg -Vía Intramuscular/ Subcutánea	ANTIINFLAMATORIO Ket-10: 1,5 ml/10 Kg -Vía Intramuscular
Mastitis	
Separar al animal enfermo del rebaño	Ordeñar todos los días y descartar la leche

ANTIBIÓTICO Pullbiotic: 2 ml/50 kg -Intramuscular Mastilac: 1 ml/50 Kg -Vía Intramuscular/ Subcutánea	ANTIINFLAMATORIO Ket-10: 1,5 ml/10 Kg -Vía Intramuscular
Respiratorio	
Cojeras/dolores musculares Equs: 0,5-1 ml/50kg -Vía endovenosa Dexbutadrag 2,5 ml/50 Kg -Vía endovenosa	Infección ocular Clorhexidina diluida en agua Limpieza del ojo afectado Oftagen (Gotas): 2 gotas cada 4 horas

Heridas infectadas	
ANTIBIÓTICO Pullbiotic: 2 ml/50 kg -Intramuscular Mordida de perros Enromic 5%: 1 ml/25 Kg -Vía Intramuscular	LIMPIEZA Clorhexidina diluida en agua Limpiar la herida 2 veces/día Moskimic Spray 1 ml/25 Kg Sobre la herida



* Los tratamientos propuestos no contemplan los días de aplicación de los mismos, restricciones ni periodos de resguardo. Esta información está contenida en la caja de cada medicamento.